(21) $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ $y'=3x^2+2ax+b$ $y''=6x+2a$

$f(1)=1$ $1+a+b+c=1$ $c=0$

$f'(1)=0$ $3+2a+b=0$ $b=3$

NO TIENE EXT REL en $x=1$

$f'(1)=0$ $\begin{cases} f''(1)>0 \Rightarrow m \\ f''(1)=0 \\ f''(1)<0 \Rightarrow M \end{cases}$ $6+2a=0$ $a=-3$

feb 4-14:06

(22) $f(x)=x^3+ax^2+bx+5$

$x=1$ PI $f''(1)=0$

T.H $f'(1)=0$

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

$f''(x)=6x+2a$

$0=m=f'(1)$

$f''(1)=0$ $6+2a=0$ $a=-3$

$f'(1)=0$ $3+2a+b=0$ $b=3$

feb 4-14:12

(27) $y=|x^2-4|$

$x^2-4=0$

-2 2

$f(x)=\begin{cases} x^2-4 & x\leq -2 \\ -x^2+4 & -2<x\leq 2 \\ x^2-4 & x>2 \end{cases}$ $V_x=0$

$f'(x)=\begin{cases} 2x & x<-2 \\ -2x & -2<x<2 \\ 2x & x>2 \end{cases}$

$f'(x)=0$ $\begin{cases} 2x=0 & x=0 \notin (-\infty,-2) \\ -2x=0 & x=0 \in (-2,2) \\ 2x=0 & x=0 \notin (2,+\infty) \end{cases}$

-2 0 2

Max rel $(0,f(0))=(0,4)$

feb 4-14:14

x	$-\infty$	-4	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$	3	4	$+\infty$
y	$+\infty$	12	5	0	0	3	4	3	0	0	5	12	$+\infty$

Max rel $(0,4)$ | Min rel $\cup$ $\nexists$

$\nexists$ Max abs | Min Abs $(-2,0) \cup (2,0)$

feb 4-14:20

EXT. ABS Y REL.

$y = x^2 + 4x + 3$

a) Ext Abs y rel

b) Ext Abs y rel $[-4, 2)$

c) " " $[-4, 2]$

d) Ext / " " $(-4, 2]$


e) " " " $(-4, -2)$

feb 4-14:24

$V_x = \frac{-4}{2} = -2$

x	-4	-3	-2	-1	0
y					

feb 4-14:25



d) igual que c)

e) igual que b)


feb 4-14:28

$y = \frac{2}{(x-1)^2}$ en $[0, 3)$

Ext Abs y rel

feb 4-14:29

34



Alcilindro = $50cm^2$

$50 = 2\pi r h$

$h = \frac{25}{\pi r}$

$V_{max} = \pi r^2 h$


$V = \pi r^2 \frac{25}{\pi r} = 25r$

$V = 25 \neq 0$

$r = 5cm \quad h = 5/\pi\ cm$

feb 4-14:30

39



50% más caro

$V = 80cm^3 = x^2 y$

$Costo = x^2 + 4xy + x^2(1.5)$

$x^2 + \frac{50}{100}x^2$

Sigue. — —

feb 4-14:35

TEOREMAS DE DERIVABILIDAD


TEOREMA DE ROLLE

f cont en $[a,b]$

f derivable en (a,b)

$f(a) = f(b)$

$\Rightarrow \exists c \in (a,b) \Rightarrow f'(c) = 0$



feb 4-14:38


TEOREMA DEL VALOR MEDIO

f cont en $[a,b]$

f derivable en (a,b)

$\xRightarrow{T.V.M}$

$\exists c \in (a,b) \Rightarrow \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$



$\exists c \in (a,b)$ / la recta tg en "x=c" es paralela a la recta que pasa por A y B

feb 4-14:43

REGLA DE L'HOPITAL $\left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}\right)$

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3+2x}{x+1} = \frac{\infty}{\infty} = \infty$$

$$\overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+2}{1} = \infty$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0}$$

$$\overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos 0}{1} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\frac{\lim_{x\to 0} \sin x}{\lim_{x\to 0} x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \sin x = \lim_{x\to 0} x$$

feb 4-14:46

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\sin x + 3x}{4x} = \frac{0+0}{0} = \frac{0}{0}$$

$$\overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{2\cos x + 3}{4} =$$

$$\frac{2\cos 0 + 3}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{2x^3 - 2x}{4x^5 + 3x^4 - 7x^3 + x^2 - 1} = \frac{0}{0}$$

$$\overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{6x^2 - 2}{20x^4 + 12x^3 - 21x^2 + 2x} =$$

$$= \frac{6-2}{20+12-21+2} = \frac{4}{13}$$

feb 4-14:49

$$\left(\frac{x+1}{e^x}\right)' = \frac{(x+1)'}{(e^x)'}$$

feb 4-14:52