$\int k\,dx = kx + C$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

$\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \sqrt{x} + C$

$\int \frac{1}{\sqrt[n]{x^{n-1}}}\,dx = \sqrt[n]{x} + C$

$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

$\int e^x\,dx = e^x + C$

$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$

$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$

$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$

$\int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen} x + C$

$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg} x + C$

feb 25-14:10

$\int (f(x) \pm g(x))\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$

$\int k\,f(x)\,dx = k \int f(x)\,dx$

$\int f(x)\,g(x)\,dx \neq \int f(x)\,dx \cdot \int g(x)\,dx$

$\int \frac{f(x)}{g(x)}\,dx \neq \frac{\int f(x)\,dx}{\int g(x)\,dx}$

feb 25-14:16

$\int (3x^2 + 2x + 1)\,dx = 3\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} + x + C = x^3 + x^2 + x + C$

$\int 2^x + \frac{1}{x}\,dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \ln|x| + C$

$\int e^x + \frac{1}{1+x^2}\,dx = e^x + \operatorname{arctg} x + C$

$\int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = 2\operatorname{arcsen} x + C$

$\int 3\cos x\,dx = 3\operatorname{sen} x + C$

feb 25-14:17

$\int \sqrt{2x} + \sqrt[3]{x^4}\,dx = \sqrt{2}\int x^{1/2}\,dx + \int x^{4/3}\,dx = \sqrt{2}\,\frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^{7/3}}{7/3} = \frac{2\sqrt{2x^3}}{3} + \frac{3\sqrt[3]{x^7}}{7} + C$

$\int x\sqrt{x}\,dx = \int x^{3/2}\,dx = \frac{x^{5/2}}{5/2} + C = \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C$

$\int \frac{1}{2x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int x^{-2}\,dx = \frac{1}{2}\,\frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{2x} + C$

$\int \frac{x^3 + 2x + 1}{x^2}\,dx = \int \left(x + 2x^{-1} + x^{-2}\right)dx = \frac{x^2}{2} + 2\underbrace{x^0}_{\ln|x|} + \frac{x^{-1}}{-1} = \frac{x^2}{2} + 2\ln|x| - \frac{1}{x} + C$

(2 · 1/x)

feb 25-14:18